

Skyrizi™  
(risankizumab)

참~쉽죠?



PsO+ PsA  
For Psoriatic Disease

# \*SIMPLE SOLUTION

\*건선 및 건선성관절염 모두 동일한 용법·용량 (건선성관절염은 단독 투여 또는 비생물학적 DMARDs와 병용투여 가능), 연 4회 투약 간격 (유지요법 기준)

[제품명] 스카이리치®프리필드시린지주, 스카이리치®프리필드펜주150mg/mL, 스카이리치®프리필드펜주150mg/mL (리산키주맙, 유전자재조합) [효능효과] 1. 판상 건선: 광선요법 또는 전신치료요법(생물학적 요법 포함)을 필요로 하는 중등도에서 중증의 성인 판상 건선의 치료 2. 건선성 관절염: 이전에 DMARDs(disease-modifying anti-rheumatic drug)에 대한 반응이 적절하지 않거나 내약성이 없는 성인의 활동성 건선성 관절염의 치료 [용법용량] 1. 판상 건선: (75mg/mL) 이 약은 1회 150mg (75mg을 2회 주사)을 0주, 4주, 그 이후에는 12주마다 한 번씩 피하투여한다. 이 약은 단독투여 또는 비생물학적 DMARDs와 병용 투여할 수 있다. (150mg/mL) 이 약은 1회 150mg을 0주, 4주, 그 이후에는 12주마다 한 번씩 피하 투여한다. 2. 건선성 관절염 (75mg/mL) 이 약은 1회 150mg (75mg을 2회 주사)을 0주, 4주, 그 이후에는 12주마다 한 번씩 피하투여한다. 이 약은 단독투여 또는 비생물학적 DMARDs와 병용투여할 수 있다. (150mg/mL) 이 약은 1회 150mg을 0주, 4주, 그 이후에는 12주마다 한 번씩 피하투여한다. 이 약은 단독투여 또는 비생물학적 DMARDs와 병용투여할 수 있다. [주요 사용상의 주의사항] 1. 경고 1) 감염 이 약은 감염의 위험을 증가시킬 수도 있다. 만성 감염이 있거나 재발성 감염 병력이 있는 환자에서는 이 약을 처방하기 전 위험성과 유익성을 고려해야 한다. 환자들에게 임상적으로 중요한 감염의 증상이나 징후가 발생하면 의학적 조언을 구하도록 환자들을 교육해야 한다. 환자에서 이러한 감염이 발생하거나 환자가 감염에 대한 표준 치료에 반응하지 않는 경우, 이 약을 면밀하게 모니터링하고 감염이 해결될 때까지 이 약을 투여해서는 안 된다. 결핵 3 상 건선 임상 시험들에서, 시험 기간 동안 이 약과 적절한 결핵 예방 요법으로 병용 치료 받은 참가자 72 명 중 이 약 투여 후 평균 61 주의 추적 기간 동안 활동성 결핵이 발생한 시험대상자는 없었다. 잠복 결핵 환자에서는 이 약을 시작하기 전에 항결핵 치료를 고려한다. 활동성 결핵 환자에게 이 약을 투여해서는 안 된다. 2) 예방 접종 이 약으로 치료를 시작하기 전에, 현행 접종 지침에 따라 모든 적절한 예방 접종이 완료되었는지를 고려해야 한다. 이 약은 생백신과 함께 사용해서는 안 된다. 생백신이나 불활성화 백신에 대한 반응에 관하여 이용 가능한 자료는 없다. 2. 다음 환자에는 투여하지 말 것 이 약의 주성분 또는 이 약의 첨가제에 중증 과민성이 있는 환자 [제조원] 제조의뢰자: AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse 67061 Ludwigshafen, 독일 [수입원] 한국애브비㈜, 서울특별시 강남구 영동대로 421 삼탄빌딩 6층, 전화: (02)-3429-9300 www.abbvie.co.kr [개정년월일] 2022년8월31일 \*의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청: 한국약품안전관리원 (1644-6223 또는 14-3330, www.drugsafe.or.kr) \*자세한 제품정보는 제품설명서를 참조해 주십시오.

abbvie 한국애브비(주), 서울특별시 강남구 영동대로 421 삼탄빌딩 6층 전화 : (02) 3429-9300, www.abbvie.co.kr

KR-RISN-220115-221206